平成１７年度　たまねぎ栽培管理記録表

播種日	移植日	根切日	収穫日	栽植密度			
3月9日～　月　日	5月4日～5月7日	8月17日～　月　日	9月3日～9月6日	畦幅(cm)	30.0	株間(cm)	11.2

◎育苗施肥

資材名	施用月日	施用量(g/坪)
TDアミノ	2/20	300
ベストグアノ	2/20	300
	/	
	/	

◎農薬以外の投入資材（葉面散布剤等）

資材名	施用月日	使用量(倍率)	資材名	施用月日	使用量(倍率)
アグリクール	6/20	1000		/	
アグリクール	7/5	1000		/	
アグリクール	7/15	1000		/	
	/			/	

◎本畑施肥

資材名	施用月日	施用量(kg/10a)	成分量			
			窒素	燐酸	加里	苦土
TDアミノ	4/24	200.0	8.0	14.6	8.0	
ベストグアノ	4/24	200.0		40.0		
	/					
	/					

◎除草剤

農薬名	安全使用基準 使用量	使用時期・収穫前使用可能日数	使用回数	散布月日 / 使用量	/ 使用量	/ 使用量	/ 使用量	/ 使用量	/ 使用量	/ 使用量
ゴーゴーサン乳剤30	300～400ml	定植活着後雑草発生前(60日前)	1回							
トレファノサイド乳剤	200～300ml	定植後雑草発生前(75日前)	2回							
アクチノール乳剤	50～100ml	6月上旬までの雑草2~3葉期(30日前)	2回							
ボルトフロアブル	200～300ml	1科雑草3～8葉期(30日前)	2回							
セレクト乳剤	50～75ml	1科雑草3～5葉期(40日前)	3回							

◎病害虫防除

用途	農薬名	安全使用基準 使用倍率	使用可能日数	使用回数	散布月日 6/3 使用倍率	6/25 使用倍率	7/15 使用倍率	7/28 使用倍率	8/18 使用倍率	/ 使用倍率	/ 使用倍率	/ 使用倍率	/ 使用倍率	/ 使用倍率	/ 使用倍率	/ 使用倍率	/ 使用倍率	/ 使用倍率	/ 使用倍率	/ 使用倍率
殺菌剤	グリーンペンコゼブ水和剤	600倍	3日	5回																
	ダコニールエース	750～1,500倍	7日	6回																
	トリアジン水和剤50	400倍	前日	8回			400													
	フロンサイド水和剤	1,000～2,000倍	7日	5回				2000												
	ストロビーフロアブル	2,000倍	14日	3回																
	シルバキュアフロアブル	2,000倍	前日	3回																
	トップジンM水和剤	1,000倍	前日	5日																
	アタッキン水和剤	800倍	7日	5回																
	ロブラール水和剤	1,000倍	7日	3回																
	スミレックス水和剤	1,000倍	前日	5回																
	スターナ水和剤	1,000倍	7日	5回																
	ビスダイセン水和剤	400～600倍	21日	3回																
	アグリマイシン100	1,000倍	7日	5回																
	バクテサイド水和剤	500～1,000倍	7日	5回																
	スクレタン水和剤	500倍	前日	5回																
	ポリベリン水和剤	1000倍							1000											
殺虫剤	オルトラン水和剤	1,000倍	3日	6回																
	トクチオン乳剤	1,000倍	30日	3回																
	ＤＤＶＰ乳剤75	1,000倍	3日	6回																
	アグロスリン乳剤	2,000倍	7日	5回																
	マブリックEW	3,000～4,000倍	7日	2回	4000	4000														
	ベイオフＭＥ液剤	1,000～1,500倍	14日	4回																
	スミチオン乳剤	1,000倍	21日	2回																
	エルサン乳剤	1,000倍	7日	4回																
	ビリーブ水和剤	1,500倍	7日	3回																
備考																				